

醫心方卷第十一

從五位下 行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治霍乱方第一

治霍乱心腹痛方第二

治霍乱心腹脹滿方第三

治霍乱心痛方第四

治霍乱下利不止方第五

治霍乱嘔吐不止方第六

治霍乱嘔噦方第七

治霍乱于噦方第八

治霍乱煩渴方第九

治霍乱轉筋方第十

治霍乱手足冷方第十一

治霍乱不語方第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治霍乱方第一

治霍乱心腹痛方第二

治霍乱心腹脹滿方第三

治霍乱心痛方第四

治霍乱下利不止方第五

治霍乱嘔吐不止方第六

治霍乱嘔噦方第七

治霍乱于瀉方第八

治霍乱煩渴方第九

治霍乱轉筋方第十

治霍乱手足冷方第十一

治霍乱不語方第十二

治霍乱欲死方第十三

治中熱霍乱方第十四

治欲作霍乱方第十五

治霍乱後煩躁方第十六

治霍乱後食法第十七

治下利方例第十八

治雜利方第十九

治冷利方第二十

治熱利方第二十一

治赤利方第二十二

治血利方第二十三

治赤白利方第二十四

治久赤白利方第二十五

治白滯利方第二十六

治膿血利方第二十七

治水穀利方第二十八

治泄利方第二十九

治泄利方第三十

治重下方第三十一

治痢利方第三十二

治盡注利方第三十三

治不伏水去利方第三十四

治臨送吐利方第三十五

治利後渴方第三十六

治利後腫方第三十七

治利後虛煩方第三十八

治利後不能食方第三十九

治利後噦方第四十

治利後逆滿方第四十一

治利後穀道痛方第四十二

治霍乱方第一

病源論云霍乱者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有

相干乱之時其乱在於腸胃之間者自遇飲食而

變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛

者則先下利心腹並痛者吐利俱發橫風而實者

身熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛

治利後遂滿方第卅一

治利後穀道痛方第卅二

治霍亂方第一

病源論云霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干オカシ之カ時其亂在於腸胃之間者自遇飲食而變發則心腹絞痛シヤリルカハニ其有先心痛者則先吐先腹痛者則先下利心腹並痛者吐利俱發橫風而實者身熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛而已チ有飲食肉腥チ之カ冷過度チ日居處不節或露卧チ濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃得冷則不磨則水穀不消化チ令清濁二氣相干腸胃虛弱便致吐利水穀不消則令心腹脹滿皆成霍亂有三名一名胃反言其胃氣虛逆吐飲食也二名霍亂言其病揮霍之間便致チ亂チ三名走哺言哺食變逆者也養生方云七月食蜜令人暴下發霍亂也千金方云論曰源夫霍亂之為病也皆因食飲非聞鬼神夫飽食チ臍腹復食乳酪海陸百品無所不啖眠卧冷滯多飲寒將水胃中諸食結而不銷陰陽二氣擁而反戾陽氣欲昇陰氣欲降陰陽永障變成吐利頭痛如破百節如解チ遍體諸筋皆為迴轉論時雖小卒痛之中最為可畏雖臨深履危不足以喻之也養生者宜達其指趣庶可免於交橫者矣極要方云得吐利者名濕霍亂不吐利者名干霍亂多斂人往有濕霍亂不有遂命之憂

集驗方云飲而吐利此為霍亂也

葛氏方云凡所以得霍亂者多起於飲食或飽食生冷物難以肥鮮酒膾而當風履濕薄衣露坐或

集驗方云歔而吐利此為霍亂也

夜卧失覆之所致也。治之方初得之便教力令温暖。

自ミカライタ把ヒカヘ冷アツキ易ヒカヘ熱者又方可燒地令熱アツク水ミカライタ洩ヒカヘ數ミカライタ蔣ヒカヘ席卧ヒカヘ

至膝并銅器若凡器盛湯以著腹上シイ衣藉之毛子介冷

便急灸之セリ但胡索次第莫為ナカレ乱灸須有其

本方言七壯イリ為可セウ四五壯分リ无イカ不活便火下得眠シ今案

千金方云凡諸霍亂忌米飯胃得中米即吐不

又云凡霍亂醫所不治方童女月衣合チウフ五燒酒服方モ

范汪方治霍乱吐下不止理中湯方人參干

三兩水六升煮取三升分三服。胃門方白朮三兩人參三兩甘草
二兩干薑二兩炙七升煮取二升半。若胃滿腹痛吐下者加當

錄驗方治霍亂虛冷吐逆下利理中丸方

彈丸取一丸內煖酒中服之曰三

范汪方治霍乱吐下不止理中湯方人參干

薑白朮甘草各二兩水三升者得一升半分二服今案小品方藥各

三兩水六升煮取三升分三服醫門方白朮三兩人參三兩薑草

一兩干薑二兩水六升煮取二升半若胃滿腹痛吐下者加當

歸厚朴各二兩若寒者湯者益主之

錄驗方治霍乱虛冷吐逆下利理中丸方

人參甘草各二兩干薑白朮各二兩凡四物搗下蜜丸如

彈丸取一丸內煖酒中服之日三今案本草蘇敬注

如梧子得十六九如彈丸二枚又方單煮厚朴飲三升有効

又方煮梨葉服之今案醫門方云取梨葉

効驗方治霍乱吐下不止散膏甘草二兩人參

二兩干薑二兩木二兩

凡四物治節酒服方寸匕白三

小品方扶老理中湯治羸老冷氣惡心食飲不

化腹虛滿物急短氣及霍乱飲逆四支冷心

煩滿氣閉流汗患主之人參五兩干薑六兩

木五兩麦門冬六兩附子二兩伏苓三兩甘草五兩

凡七物下節節作散臨病者三合白湯和方寸

匕一服不効又服常將者蜜丸酒服如梧子廿九

又云霍乱吐下汗出客冷轉筋飲逆煩悶欲得

冷水者方可与厚朴葛飲進沾喉中而已慎勿

与米飲及粥但与此單行飲以代米飲水將

水也又方取霍香一朮以水四升煮取一升頓服立

愈今案本草云一朮又方煮青木香汁飲至佳又云治

卒通中得霍乱无有方藥危急方蘆薈

耳大杞煮令味濃頓服二升即差有効

醫門方治霍乱吐下不止者方煮百沸湯細

添生水熱飲之今案那繁論云熱水一升又方或煮

高良薑或煮木煎汁飲之通玄經云治霍

本也又方取霍香一升以水四升煮取一升頓服立愈今案本草云一杞重二兩為正又方煮青木香汁飲至佳又云治

卒通中得霍乱无有方藥危急方 蘆薈

耳大杞煮令味濃頓服二升即差有效

醫門方瀉霍乱吐下不止者方煮百沸湯細

添生水熱飲之今案鄭繁論云熱水一升主水一升相和飲之良驗又方或煮

高良薑或煮木炭汁飲之一名火石炭通玄經云治霍

乱方木炭煮作飲服之今案本草陶隱居云君子并枝煮飲

救急草驗方療霍乱方桂三兩煮汁取一盞

頓服驗陶量本草注云霍乱吐下方柳材削

作楠者服之治霍乱心腹痛方第二病源論

云霍乱而心腹痛者是風冷之氣客於府藏之

間冷氣相擊或上攻心或下攻腹故心腹痛也葛氏

方治霍乱若腹痛急似中惡者方

檮生昌蒲根飲汁少令下咽即差又云卒得霍

乱先腹痛者方灸臍上一夫十四壯名大倉若繞脊痛

者灸臍下三寸四壯名關今案千金云一夫者心四指為一手夫即當大倉捷要方療

霍乱心腹激痛方當歸三兩桂心三兩干薑三兩甘草

一兩右以水七升煮取二升分三服小品方治心腹暴

痛及宿食不消或宿冷煩滿成霍乱方作塩湯三升

使極醺熱飲一二升刺吐令宿食盡不吐復服吐訖

使極醺熱飲一復飲三吐乃佳漢靜乃止勝諸湯

丸今案廣濟方塩一升水三升煮取一升三合溫服八合又云霍乱腹痛吐下方

取桃葉冬天用皮絞取汁一服一杯立愈亦可濃煮

飲三升者要方治霍乱先腹痛方煮生薑熱飲之

又方厚朴汁飲之僧深方瀉霍乱腹痛而煩方

高良薑四兩以水五升煮取二升分二服蘆薈

草注霍乱絞痛方粟米泔汁飲數升立差

使極熱飲一復飲三吐乃佳煩靜乃止勝諸湯

丸今案廣濟方極一升水三升又云霍亂腹痛吐下方

取桃葉冬此四字注天用皮絞取汁一服一杯立愈亦可濃煮

飲三升者要方治霍亂先腹痛方煮生薑熟飲之

又方厚朴汁飲之僧深方治霍亂腹痛而煩方

高薑四兩以水五升煮取二升分二服名入心方下種散本

草注霍亂絞痛方粟米泔汁飲數升立差

廣濟方療霍亂心腹痛煩瀉不止方厚朴四兩

橘皮二兩人參二兩當歸二兩霍香一兩高良薑

四兩切以水七升煮取二升五合分溫三服忌生冷

粘食通玄方治霍亂先腹痛方好驗酢細飲

一盞許大方用火炙腹及背得汗即愈

治霍亂心腹脹滿方第三病源論云霍亂而心腹

脹滿者是寒氣與藏氣相搏真耶相攻不得吐利

故令心腹脹滿

葛氏方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

生薑若干薑一二升以水五六升煮三沸頓服若不即

愈更可作又云治若煩悶湊滿者方

灸心下三寸七壯名上管又方以塩内臍中灸上二七

壯又云治煩瀉腹脹厚朴湯方厚朴四兩桂二兩枳

實五枚生薑三兩以水六升煮取二升分三服

耆婆方治霍亂煩悶湊滿方厚朴二兩以水三升

煮取一升半分三服老人小兒半佳花注方治霍

亂腹中脹滿惡毒悶絕不通氣之息急危方生薑

累支子十四枚桂心一兩香豉五合四物槁以酒并解之

去滓頓服今案錄驗方生薑累數以其一文為累取服肥大

為小品治方霍亂腹痛脹滿短氣不得坐下茶不効

者挾伏心藏中煩悶鬱者方可取白粉水和如糜汁

耆婆方治霍乱煩悶湊滿方厚朴二兩多以水三升

煮取一升半分三服老人小兒止佳花注方治霍

乱腹中脹滿惡毒悶絕不通氣之息急危方生薑

累支子十四枚桂心一兩香豉是義文五合四物槁以酒并解之

去滓頓服今案錄驗方生薑累數以其一文為累取服肥大

者勢伏心藏中煩悶鬱鬱者方可取白粉水和如糜汁

傾之頓飲一升許即吐者便愈不吐者刺吐之永不吐者

皆危也无粉者折粉米取升僧深方治霍乱腹脹

滿不得吐方梁米粉五合以水一升半和如粥頓服更

吐若不吐難治痛端目錄作痛字

治霍乱心煩方第四

病源論云霍乱而心煩者太吐大利府藏氣暴極

故心煩之有未吐利而煩者是冷氣入於腸胃

逆上故心煩

醫門方療霍乱心煩方

香豉七合綿裹文子人三兩厚朴三兩

水五升煮取二升去滓分區二服重者不過再必愈

通玄經云霍乱心煩悶不已方

用粟米汁飲之半升即愈

又方服粟米粉和水服一合立愈

又云霍乱吐下已止發熱心煩欲飲水方

可与少秫米粉汁佳若不止可与葛根是義文著是義文差飲也

治霍乱下利不止方第五

病源論云霍乱而下利不止者是腸胃俱是義文而是義文狹宿虛

穀氣不消故也

小品方治霍乱洞下腹痛方

以艾一把以水三升煮得一升頓服之良

又云霍乱平吐下不禁者人參湯主之方

人參二兩是義文大艾二兩是義文葛根二兩是義文橘皮二兩是義文

可与少秫米炊汁佳若不止可与葛根著蔗飲也
脂粉二音

治霍乱下利不安方第五

病源論云霍乱而不利不止者是腸胃俱冷
穀氣不消故也

小品方治霍乱洞下腹痛方

以艾一把以水三升煮得一升頓服之良

又云霍乱平吐下不禁者人參湯主之方

人參二兩 伏苓二兩 葛根二兩 橘皮二兩

麥門冬二兩 甘草二兩

凡六物以水五升煮取二升分三服

葛氏方治霍乱下利不止者方

灸足大指本節內一寸側白完際左右各七壯名大都

又云霍乱吐下不止方于薑茱萸各一兩水二升者取一升服

又云灸兩乳邊里外近腋白完際各七壯

今案治霍乱吐利理中湯理中丸主之在上條

又云先洞下者灸臍邊一寸男左女右各十四壯

又云吐而下不止者灸臍下一夫約中七壯

治霍乱嘔吐不止方第六

病源論云霍乱而嘔吐者冷氣入於胃氣變亂冷耶

既成穀氣不和胃氣逆上故嘔吐也

葛氏方治霍乱嘔吐不止方

生薑五兩水五升煮取二升半分三服

僧深方治霍乱煩痛嘔吐不止并轉筋方

生香薷一把桂心二兩 生薑三兩 三物以水七升者煮

半分二服甚良

又云霍乱嘔吐水藥不下茱萸湯方

茱萸一升 黃連二兩附子一兩 甘草一兩 生薑三兩

凡五物以水七升煮取三升分三服

小品方治霍乱嘔吐及暴下方

僧深方治霍乱煩痛嘔吐不心并轉筋方

生香葉一匕桂心二兩生薑三兩三物以水七升煮取

升分二服甚良

又云霍乱嘔吐水藥不下茱萸湯方

茱萸一升黃連二兩附子一兩甘草一兩生薑三兩

凡五物以水七升煮取三升分三服

小品方治霍乱嘔吐及暴下方

半夏三兩干薑四兩人參三兩桔梗三兩附子四兩

凡五物下節臨病和之若吐下不心者以苦酒和之飲

服二丸如梧子大

范汪方治霍乱嘔吐附子湯方

大附子一枚甘草六銖蜀椒二百粒三物水三升煮取

一升半分再服

治霍乱嘔吐方第七

病源論云霍乱而嘔者由吐利後胃虛而逆則嘔氣逆

遇冷析之氣不通則嘔之

范汪方治霍乱嘔吐氣厥不得息方

香豉一升半夏一兩甘草一兩生薑二兩

人參一兩蘇胡一兩六物以水五升煮取二升半

服七合日三

又方半夏二兩生薑二五兩水三升煮得一升二分

再服

葛氏方霍乱若死者

灸手腕第一約理中七壯名心主當中指也

小品方治霍乱嘔吐吐逆良久不心方

灸巨闕並大倉各五十壯今案巨闕在去鳩尾骨端一寸大倉者中管穴在上管下一寸

治霍乱于嘔方第八

病源論云霍乱而于嘔者吐下後脾胃虛冷三焦不

再服

葛氏方霍乱若宛者

灸手腕第一约理中七壮名心主當中指也

小品方治霍乱欬喘吐逆良久不止方

灸巨闕並大倉各五十壮

今案巨闕在去鳩尾骨端一寸大倉者中管亦在上管下一寸

治霍乱于脇方第八

病源論云霍乱而于脇者吐下後脾胃虛冷三焦不

理氣否結於心下氣時逆上故于脇者謂欬喘

而无所出也

小品方治霍乱或引飲輒于飲方

生薑五兩以水五斗煮令得二斗半分再服良

又云治于飲逆氣手足厥冷橘皮湯方

橘皮四兩 生薑半斤

凡二物以水七斗煮取三斗一服

一斗湯下咽即愈

葛氏方霍乱于脇者方

灸手腕後三指大兩筋間左右各七壮名間使

又方取薤白一握以水二斗煮令得一斗半服之

不過三作

治霍乱煩渴方第九

病源論云霍乱煩渴者大利津液竭則藏燥

則渴也煩渴不止則引飲則利不止

葛氏方治霍乱吐下後大渴多飲則斂人方

可以黃蘗米五斗水一斗煮之得三斗

澄稍飲之勿飲餘飲之

醫門方霍乱熱心煩渴者方

以糯米水漬研之以冷漿水混取米泔汁意飲

之即定極効

則渴也煩渴不上則引飲則利止不止

葛氏方治霍亂吐下後大渴多飲則斂人方

可以黃粟米五升水一斗煮之得三升

澄稍飲之勿飲餘飲之

醫門方霍亂熱心煩渴者方

以糯米水漬研之以冷漿水混取米泔汁意飲

之即定極効

僧深方霍亂吐後煩而渴方

紫蘘子一升水五升煮取二升分二服元子取生蘘

一升水四升者一升半分二服

小品方治霍亂煩渴者方

梁米汁泔飲數一升立斂

又方取新汲冷水飲之

集驗方云治霍亂而渴者理中湯主之

治霍亂轉筋方第十

病源論云霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也

葛氏方霍亂轉筋者方

灸臍心下五六壯名涌泉

又方灸大指上爪甲際七壯

又方苦酒和粉塗痛上

又云轉筋入腹痛者方

令四人捉手足灸脊左一寸十四壯

又云若轉筋入腹中如欲轉者方

燒綿薦索三指撮酒服之

又方釜底墨末酒服之

又云腹中已轉筋者方

當倒擔病人頭在下勿使及地腹中平乃心

又云若兩臂脚及背脊轉筋者方

令四人捉手足灸脊左一寸十四壯

又云若轉筋入腹中如欲轉者方

燒綿薦索三指撮酒服之

又方釜底墨末酒服之

又云腹中已轉筋者方

當倒擔病人頭在下勿使及地腹中平乃心

又云若兩臂脚及背脊轉筋者方

取塩一升半水一斗煮令熱漬手足在背脊者湯洗

之轉筋入腹中若刺者引陰縮必死猶在倒擔

之可與也

千金方霍亂轉筋方

葱一把去兩頭水二升煮取一升頓服之

又方內塩香中灸二十七壯并治腹脹

又方以車轂中脂塗足心下

又方灸少腹橫骨中隨年為數

又云轉筋在兩臂及胸中方

灸手掌白肉際七壯又灸臍中府臣腧胃管

小品治霍亂轉筋方

以苦酒煮布裹漬之冷復易又方可以白龍煮

粉及熱洗之

龍門方治霍亂轉筋方

取木瓜子根莖煮湯服驗

醫門方治霍亂轉筋方

取熱燭灰以驗醋和合微溫炒令極熱青布裹

及熱熨筋上冷易之隨平消散也

又云霍亂遍身轉筋入腹不可奈何方

多作塩湯內舂槽中令溫暖漬之佳小品方

云大驗

取木瓜子根莖煮湯服驗

醫門方治霍亂轉筋方

取熟糖灰以驗醋和合微溫炒令極熱青布裹及熨熨筋上冷易之隨平消散也

又云霍亂遍身轉筋入腹不可奈何方

多作塩湯内舂槽中令溫暖漬之佳小品方

云大驗

桂要方霍亂轉筋方

主薑一升 右水七升煮取二升分三服

刑繁論霍亂轉筋方

取絮巾右綿炙暖以傳筋上

今案范汪方轉筋在脚腫脚入腹纏腹厚溫熨已向大也

范汪方治霍亂轉筋方

甞壤土水和塗其上愈又方取鹽合粉小溫之塗于麻之

廣利方治霍亂轉筋入腹方

取塩三合以水五升煮取三升以青布浸湯中用拭轉

筋上

陶景本草注云治霍亂轉筋者

但呼木依名及書上作木依字皆金愈

治霍亂手足冷方第士

病源論云霍亂大吐下其腸胃俱虛乃至汗出其脉欲

絕手足皆冷名為四逆者謂陰陽乖厥絕也

葛氏方先手足逆冷者方 灸足内踝上一夫兩足各七壯

又云治下不上手足逆冷方

枳百枚 附子一枚 水三升煮取一升一服

醫門方霍亂吐利不止心煩不安逆冷方

厚朴甘草人參白朮各二兩生薑三兩以水六升煮取三升服

小品方霍亂多寒手足寒厥脉絕茱萸四逆湯主之方

果茱萸二升 當歸三兩 芍藥二兩 桂心四兩 細辛二兩

葛氏方先手足逆冷者方 灸足內踝上一夫兩足各七壯
又云治下不上手足逆冷方

枳百枚 附子一枚 水三升 煮取一升一服

醫門方霍亂吐利不止心煩不安逆冷方

厚朴甘草人參白朮各二兩 生薑三兩 以水六升 煮取三升 分服

小品方霍亂多寒手足寒厥脈絕 茱萸四逆湯主之方

果茱萸二升 當歸三兩 芍藥二兩 桂心四兩 細辛二兩

生薑半斤 通草二兩 甘草二兩

凡八物以水四升 清酒四升 合煮取三升 分四服

錄驗方霍亂吐下而汗出小便復利或下利清穀裏外

熱脈微欲絕或惡寒而支物忌手足厥逆四逆湯主之方

人參三兩 干薑二兩 附子二兩 甘草三兩

凡四物以水六升 煮取三升 分三服 轉筋者冷汗

出厥逆者良 小品方同之

治霍亂不語方第十二

葛氏方治霍亂欲死不能語方

生薑一斤 切水七升 煮取二升 分三服

又方飲竹瀝少許 又方蘆蓬芽大把濃飲二升

即差 又方干薑三兩 甘草一兩 附子一兩 水三升 煮取升

分三服

治霍亂欲死方第十三

病源論云霍亂而欲死者由飲食不消冷氣內搏或未

得吐利或雖吐利冷氣未歇致真耶相干陰陽交爭

氣厥不理則煩悶逆滿目之故欲死

拯要方療霍亂臨而煩悶脈喘垂死經日不解方

厚朴四兩 桂心四兩 枳實三兩 生薑十兩 以水八

升 煮取三升 分三服

葛氏方治霍亂衆治不差煩躁欲死脹氣急方

病源論云霍亂所故死者由飲食不消於胃內積聚
得吐利或雅吐利冷氣未歇致真耶相干陰陽交爭
氣厥不理則煩悶迷滿回之故欲死

捷要方療霍亂臨而煩悶脹喘垂死經日不解方

厚朴四兩桂心四兩 枳實三兩生薑十兩以水八

升煮取三升分三服

葛氏方治霍亂衆治不差煩躁欲死脹氣急方

燒童女月經衣血末以酒服少立差

又云治霍亂神祕起死灸法

以物橫度病人口中屈之從心鳩尾度以下各度

下頭五壯橫度左右腹各五壯此處先灸中央

又方灸脊上以物圍令心心厭又夾脊左右一寸

各七壯是腹背各灸三處也

又云華他治霍亂已死上屋喚魄者諸治皆至而猶不

著者方

捧病人覆卧之申臂對以繩度兩肘頭依繩下

夾背脊大骨中去脊各一寸灸之百壯死不治

者已試數百人皆即

起坐他以此術傳其子度世秘不傳也

又云注利不止而轉筋大腹欲死方

生薑三累相破以酒升半煮三四沸頓服之

治中熱霍亂方第十四

小品方治中熱暴下利霍亂變熱心煩脈數者方

飲新出井水一升立愈飲多益善此治是胃中

多熱者也無熱者慎之不可与也

又云薤白湯治先有石熱因霍亂吐下服諸熱藥

吐下得上因空虛仍變煩干足熱口燥欲得水飲遲遲

問脈急數者及時行熱病後毒未盡曰霍亂吐下仍

治中熱霍亂方第十四

小品方治中熱暴下利霍亂變熱心煩脈數者方
飲新出井水一升立愈飲多益善此治是胃中
多熱者也無熱者慎之不可與也

又云薤白湯治先有石熱因霍亂吐下服諸熱藥
吐下得上因空虛仍變煩干足熱口燥欲得水飲達迷
悶脈急數者及時行熱病後毒未盡曰霍亂吐下仍
發熱煩悶胃心欲破利衣者方

薤白二兩 人參二兩 厚朴二兩 知母二兩 枳實二兩
葛根二兩 枳實二兩 犀角二兩 藍子二兩 桔梗二兩
橘皮二兩 伏苓二兩 黃芩二兩 甘草二兩
凡十四物以水八升煮取三升分五服

治欲作霍亂方第十五

者波方治人腹脹欲作霍亂方
厚朴二兩 以水三升煮取一升半分三服即老
最善老人三佳復秋月恒量此藥在家有急即道
服

醫門方療心腹脹滿堅痛煩悶不安雖未吐下欲霍亂方
取塩五合水一升煮令消頃服之當吐食出即定如不吐
更宜服 今案葛氏方塩二升以水五升
煮取二升頃服

葛氏方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方
生薑若干薑一二升以水五升煮取三升頃服

小品方治霍亂煩擾未得吐下方

煮香葉汁熱飲之 今案葛氏方去取藜若香葉細切
二升水五煮再三沸頃服

治霍亂後煩躁方第十六

病源論云霍亂之後而煩躁卧不安者由吐下後府
藏虛極陰未理血虛氣亂血氣之行未復常度內乘
於府藏故煩躁不安卧也

生薑若干薑一二升以水五六升煮三沸頓服

小品方治霍亂煩擾未得吐下方

煮香葉汁熱飲之

今案葛氏方云取藜若香葉細切二升水五煮再三沸頓服

治霍亂後煩躁方第十六

病源論云霍亂之後而煩躁卧不安者由吐下後府

藏虛極陰未理血虛氣亂血氣之行未復常度內乘

於府藏故煩躁不安卧也

葛氏方治霍亂後煩躁卧不安方

葱白廿枚大棗十枚水二升煮取一升頓服之

治霍亂後食法第十七

醫門方云若霍亂吐利之後胃氣虛弱不可強食

便更作病俟待須食仍微與稀飲勿令至飽其飲

宜炒粟米者之為佳

千金方云凡此病定已一日不食為佳仍須三日少

與粥三日已後乃恣意食息也仍七日勿雜食為佳

治下利方例第十八

千金方云論曰凡利有四種謂冷熱討盪冷則白熱則

赤甘則赤白而難盪則純赤血熱則多赤黃連去其干

薑冷則加其熱藥甘則以藥吹灌下部盪則以盪

法酒之

又云古今利方千萬不可具載此中但揀其効者七

八而已雖然弘之在人也何則陟厘丸烏梅丸松皮散

等暴利服之何有不差其溫脾陽連脾丸久下得之

焉能不愈也

醫門方云辨見下利者因多觸熱飲水或夜露坐

卧胃霜雪風寒耶氣客於皮膚流傳入於藏府隨其

冷熱腹胃不調或因食肥膩而生或因食冷熱而發春

生於風而復生滯泄者未詳其理

公而己雖然弘之在人也何則俗用音各陽虛其氣格於皮膚前ホシタ等暴利服之何有不差其溫脾陽達脾丸久下得之イハクシ焉能不愈也

醫門方云辨見見下利者因多觸熱飲水或夜露坐コフコロ卧胃霜雪風寒耶氣客於皮膚流傳入於藏府隨其ホシタ冷熱腹胃不調或因食肥膩而生或因食冷熱而發トホホラ生於風而復生滯泄者未詳其理

又云下利欲飲者為有熱利而不渴其藏有寒下ホシタ利後更煩按其心下軟者為虛煩也

又云下利有不欲食者有宿食宜下下利甚時ホシタ後發此為不盡宜下下利腹滿不減不足言當

利而識語必有燥屎當下下利脉遲滑實者為未ホシタ上宜下下利脉數而滑者有宿食急下腹痛而利

但當溫之ホシタ

又云下利甚者手足痺不仁下利而反發熱身形ホシタ汗出者自愈下利脉數而渴欲飲自愈下利熱汗出

者自愈

又云下利手足无脉灸之不溫微喘者死下利後脉絕ホシタ手足厥冷平時脉遲手足溫者生脉不還手足冷

者死又云凡人久下利或熱暴下兩日即有遷延口唇生ホシタ瘡口中舌上唇生瘡如粟瘡割者心中懊悶唾

血此為虫在上食人五藏下唇內生瘡者食人下部ホシタ欲卧宜以散重藥療之

葛氏方云下利手足逆冷灸之不暖或无脉微喘者死下ホシタ利舌萎煩躁而不渴者死下利不禁膿垢出者死今業

下利人可食物

赤小豆ホシタ孟詵云 小麦ホシタ本草云 青梁米ホシタ本草云 黃梁米

本草云 舟黍米ホシタ本草云 粳米ホシタ本草云 橘ホシタ本草云 柚ホシタ本草云

本草云 每本草云 本草陶注云 留本草云 留本草云 留本草云

血止癰毒在上食人五藏下屬內生瘡者食人下音
欲卧宜以散重藥療之

葛氏方云下利平旦逆冷者之不爽或元脉微喘者死下
利舌萎煩躁而不渴者死下利不禁腸垢出者死今案

下利人可食物

赤小豆 本草云 孟詵云 止痢 小麦 本草云 止利 青梁米 本草云 止利 黃梁米

止痢 舟車米 本草云 止利 粳米 本草云 止利 橘 本草云 止利 柚 本草云 止利

梅 本草云 止利 柿 本草云 止利 石榴 本草云 止利 通草 本草云 止利

橡實 本草云 止利 雉 本草云 止利 雲雀 本草云 止利 鷄 本草云 止利

鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利

鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利

鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利 鴈 本草云 止利

蜀料 本草云 除下利 下利人可忌物

千金方云九利病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪麋

乾脯醬粉醢所食諸食皆大須就爛為佳亦不得傷

飢此將息之大經也

養生要集云腹中有冷患飲乳汁令腹痛油利食

經云杏人不可多食令人熱利

治雜利方第十九

病源論云雜利謂利色無定水穀或膿或血或青或

黃或赤或白變雜元常或雜色相兼而利也扶

熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青

黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故易變

小品方治雜下方第一下赤二下白三下黃四下青

五下黑六固病下如瘕赤面七下八下不可止

九連年下十平下十一下少血數十二霍亂而下十三

下如捨水十四下已則煩十五息下一作一上十六而不

欲食十七食者數但下者十八下但欲飲水十九重

契則黃赤契甚則變膿血也。以見其甚則黃
黑。皆由飲食不節。令契不調。胃氣虛故易變。

小品方治雜下方第一。下赤二下白三下黃四下青
五下黑六固病下。如瘕赤面七下八下不可止
九連年下十卒下十一下少血數十二霍亂而下十三
下如捨水十四下已則煩十五息下一作一上十六而不
欲食十七食者數但下者十八下但欲飲水十九重
下廿下雜錯不可詔字合廿種下。江夏大守以此
法治是下盡愈方。

黃連一兩 黃蘗一兩 乾姜一兩 附子一兩 甘草一兩
干薑二兩 烏梅廿枚 去核取實 煎之

凡七物合下後蜜和丸如大豆飲服十九漸
至廿九日三

范汪方烏梅丸治萬種下利方

干薑 黃連 蘗 黃芩 艾各一兩 烏梅廿枚 取肉

右六物丸如梧子服十九日三老少半良驗

又云治下利日百行師所不治方

麴刺服一方寸三以食愈為度當以粟米粥

服之

令李方治下利一日百起黃連散方

黃連二兩 甘草二兩 凡二物治諸酒服方寸匕

日三立食

樣要方療冷熱不調或滯或水或五色血者方

醋石榴五枚合穀子搗絞取二升汁服五合

廣濟方療百十種雜痢黃連湯方

黃連一兩 干薑一兩 乾姜一兩 附子一枚 蜀椒

十四粒 阿膠如手大 切如水五升煮取二升五合絞

去澤內膠更上火煎膠烱氣溫三服忌生冷

阿膠
出東阿故名之

樣要方療冷熱不調或滯或水或五色血者方

醋石榴五枚七カハ合穀子オカラカハア搗絞取二升汁服五合

廣濟方療百十種雜痢黃連湯方

黃連一兩カクテモ干薑一兩ヤイクモ乾薑一兩ヤイクモ附子一枚モロ蜀椒モロ

阿膠
出東阿以名之

十四粒カハ阿膠如手大モロ切如水五升モロ煮取二升五合モロ絞モロ

去澤內膠更上火モロ煎膠烊モロ分溫三服モロ忌生冷モロ

傳信方云一切痢神効方

黃連二兩半モロ黃蘗一兩半モロ零羊角半兩モロ伏苓半兩モロ

石四味為散蜜和モロ用薑蜜湯下モロ

灸諸利方

經心方云灸臍中稍至二三百壯又灸關元三百壯

并治冷腹痛モロ關元者下三寸是也

新錄方云灸脊中十三百壯モロ從大椎度至窮骨中折則是也

又方灸脾俞百壯モロ第十一椎兩旁名脾俞

又方灸腸俞百壯モロ第十六椎兩旁名大腸俞

今案石論云金液丹十種水穀赤白等利此丹皆治

治冷利方第廿

病源論云腸胃虛弱受於寒氣腸胃虛則泄故

為冷利也凡利色青白里皆為冷也色黃赤是熱

也故利色白食不消謂之寒中也

千金方駐車丸主大冷洞利腸滑下赤白如魚腦

日夜无節度

腹痛方

黃連六兩カクテモ干薑二兩モロ當歸三兩モロ阿膠三兩モロ四味以

大酢五合モロ群膠和之モロ餅手丸如大豆服之大人服卅

丸小兒百日以還三丸暮歲者五丸五服

葛氏方下色白食不消者為寒下方

千金方駐車丸主大冷洞利腸滑下赤白如魚腦
日夜无節度

腹痛方

黃連六兩 干薑二兩 當歸三兩 阿膠三兩 四味以
大酢五合 群膠和之 餅干丸 如大豆服之 大人服卅
丸 小兒百日以還三丸 暮歲者五丸 五服

葛氏方下色白食不消者為寒下方

干薑赤石脂各等分 白飲和丸 如梧子日九服

三夜一

又方暖石榴皮燒末服方寸匕

又方生薑汁二升 蜜合煎取二升 頓服

又方豉一升 薤白一杞 水三升 煮取二升 及漿頓服之

有大素肉者收良

又云有心患冷者 瀉下白如鼻涕治之方

龍骨 干薑附子各等分 搗密丸 服如梧子五丸

至十丸日三

范汪方治寒冷下種方

干薑四兩 人參三兩 檣梗四兩 附子四枚 半

復三兩 洗 凡五物下篩和丸 平旦服五丸 如梧

子日再漸加 更勿食

又云四順湯治逆順寒冷飲食不調下利方

甘草三兩 人參二兩 當歸二兩 附子一兩 干薑

三兩 凡五物水七升 煮取二升半 分三服 今案隋

深方加龍骨二兩

又云四逆湯治下利清穀身及惡寒手足逆冷此為

四逆湯主之 相視病人与方相應便与之方

甘草二兩 附子一枚 干薑一兩半

凡三物以水三升煮取一升二合 分二服

甘草三兩 人參二兩 當歸二兩 附子一兩 干薑
三兩 凡五物水七升 煮取二升半 分三服
深方加龍骨二兩 今案隋

天云四逆湯治下利清穀身及惡寒手足逆冷此為
四逆湯主之相視病人与方相應便与之方

甘草二兩 附子一枚 干薑一兩半
凡三物以水三升 煮取一升二合 分二服

小品方黃連湯治春月暴熱解脫飲冷或腹濕地
中冷腹痛下青黃汁疲極欲死方

黃連四兩 當歸二兩 干薑三兩 厚朴二兩
凡四物切以水七升 煮取三升 分二服
今案經云无厚朴 有石榴皮

秘迹方溫中湯治寒中飢臭出方
甘草一兩 干薑半兩 蜀椒八十枚 附子一枚
去水者 七合

凡四物以水二升 煮取一升 分再服 若飲內橘皮
半兩者少者皆取服良

廣濟方療冷痢青白色腹內常鳴行數踈出即
太多調中散方

龍骨一兩 人參一兩 黃連一兩 阿膠一兩 黃蘗兩
兩梲節為散煮米飲服忌猪魚蒜肉粘食等

集驗方治久新寒下利腹內不安食輒注下令人
生肉烏梅丸方

烏梅三百六十枚 附子四枚 乾薑連
十二寸 乾薑四寸

治契利方第廿
凡四物梲下篩蜜丸飲服如梧子十九日再服方

病源論云腹胃虛弱風耶桂契乘之腹虛則泄故
為契利也其色黃若契甚黃而赤也

錄驗方青要結腸丸治契毒下不絕不同久新恙治

烏梅三百六十枚ホシメ 去核ヒナ 梨イリ 可イメ 附子フシ 四カク 方ケ 黃連カク

十二寸 乾薑シラハヒカア 四寸

凡曰物檇下カ 篩カ 蜜ハチ 丸マ 飲カ 服カ 如カ 梧子カ 十九カ 日カ 再カ 服カ 方

治熱利方第廿一

病源論云九上キニ 腹ハ 胃ハ 虛ハ 弱ハ 風ハ 耶ハ 桂ハ 藥ハ 乘ハ 之ハ 腹ハ 虛ハ 則ハ 泄ハ 故ハ 為ハ 熱ハ 利ハ 也ハ 其ハ 色ハ 黃ハ 若ハ 熱ハ 甚ハ 黃ハ 而ハ 赤ハ 也ハ

錄驗方青要結腸丸九 治熱毒下ハ 不絕ハ 不同久ハ 新恙治之方

若參ハ 橘皮ハ 阿膠ハ 獨ハ 治ハ 夕藥ハ 黃連ハ 薑ハ 青ハ 一

方ハ 干薑ハ 曰ハ 分ハ 伐ハ 鬼ハ 薑ハ 藥ハ 甘草ハ 各ハ 曰ハ 分ハ 凡ハ 十ハ 物

合ハ 檇ハ 下ハ 篩ハ 蜜ハ 烱ハ 膠ハ 和ハ 之ハ 併ハ 手ハ 檢ハ 作ハ 丸ハ 如ハ 梧ハ 子ハ 干

以飲服十九日ハ 三ハ 日ハ 不ハ 和ハ 稍ハ 增ハ 格

不和稍增ハ 同ハ 方

經心方烏梅湯治熱毒下有濕方ハ 甘果

黃連ハ 二兩ハ 烏梅ハ 卅果ハ 阿膠ハ 一兩ハ 支子ハ 卅枚ハ 黃蘗ハ 一兩ハ 五味以水五升ハ 煮取二升半ハ 分再服ハ

雜錄方熱利者方

干桑ハ 卅枚ハ 水三升ハ 煮取一升ハ 頓服ハ

又方ハ 豉ハ 二升ハ 水三升ハ 煮取一升半ハ 二服ハ

省婆方黃連丸治中熱下痢方

黃連ハ 十二分ハ 干薑ハ 八分ハ 當歸ハ 八分ハ 右三物ハ 搗ハ 篩ハ 蜜ハ 丸ハ 如梧子ハ 服二丸ハ 不知ハ 加之ハ

葛氏方下色黃者ハ 熱毒熱下也ハ 治之方

支子ハ 十四枚ハ 去皮ハ 搗ハ 蜜ハ 丸ハ 如梧子ハ 服三丸ハ 日三

又挾熱者ハ 多下ハ 赤膿ハ 或難血ハ 治之方

薑連ハ 竈中ハ 塵末ハ 酒服二方寸ハ 日三

又方ハ 薤ハ 一ハ 把ハ 煮ハ 雞ハ 臠ハ 鮮ハ 肉ハ 林米ハ 食之ハ 多ハ 差

千金方治熱利諸治不差方

和丸如梧子服二丸不知加之二

葛氏方下色黃者^{カクテクセ}湯毒熱下也治之方

支子十四枚去皮搗蜜丸^{ツイモ}如梧子服三九日三

又挾熱者^{カクテクセ}多下赤膿或難血治之方

薑連^{カクテクセ}竈中塵末酒服二方寸匕日三

文方薤一犯煮雞臠^{フナ}與鮮肉林米食之多差

千金方治久利熱諸治不差方

烏梅^{ホシムス}客一升^{カクテクセ}黃連一升^{カクテクセ}金色者二味蜜和如梧子

服廿九日三夜一神良^{アタタヒトモ}僧深方同之

廣濟方瘡熱毒痢甚數出不多腹中刺痛方

生犀角末三兩^{セキロウカハ}酸石榴皮三兩^{カクテクセ}枳殼三兩^{カクテクセ}

搗為散飲服兩方寸匕日再忌熱食

治赤利方第廿二

病源論云腸胃虛弱為風邪所傷則挾熱乘於

血^{色滲多}流滲入^腹与利相雜下故為赤利

醫門方療赤利腹中絞痛下部瘕重方

黃連^{カクテクセ}當歸^{ヤセリ}黃蘗^{キタ}乾薑^{クシスエカ}各二兩^右檮^チ師為散者^{余丸}

烏梅^{ニルシモ}汁服方寸匕日二

如意方治下赤利術

金色黃連^{カクテクセ}一升^{去毛}黃蘗^{キタ}一斤^{ハタ}犀角二兩^七凡三物

切以水五升煮取三升^七去滓^七內白蜜一升^七又煎三升

平旦服至日中令盡勿間食也

救急單驗方治赤利方

黃連^{カクテクセ}三兩^{キタ}黃蘗^{キタ}三兩^{ハタ}支子^{ノナシスネ}人二兩^七凡三物以物以

水九升者取五升分三服^セ

又方^{カクテクセ}搗黃連^{カクテクセ}和水服一匙以差為度^{ヒトカヒ}

治血利方第廿三

病源論云血利者熱毒折於血入太腸故也身熱者

平旦服至日中令盡勿間食也

救急單驗方治赤利方

黃連三兩黃蘗三兩カクテツセ女子人二兩凡三物以物以

水九升者取五升分三服

又方搗黃連カクテツセ和水服一匙以差為度

治血利方第廿三

病源論云血利者熱毒折於血入太腸故也身熱者死身寒則生

千金方治大熱毒血利治不可著者方

黃連六兩一味水以七升煮取二升半夜露著

日星下且空腹頓服之卧息即止

槎要方療血痢方

真生犀角末五兩阿膠四兩カクテツセ干薑三兩艾葉

三兩カクテツセ黃蘗四兩右五物搗師為散服方寸匕

廣利方理血痢方

酸石榴一顆カクテツセ和皮搗取汁蜜一大匙和煖頓服之

治赤白利方第廿四

病源論云其利而赤白者是熱乘於血カクテツセ深腸內則

赤也氣入間搏腸間津液滯則白也カクテツセ春熱相文也則

赤白相雜カクテツセ重者狀如膿涕而血雜之輕者膿上

有赤脉薄血狀如魚之世謂之魚腦利也

本草經治赤白利方卿真作齋食之

錄驗方鵝蜜丸治赤白利方

朴消一兩カクテツセ黃芩一兩カクテツセ大黃一兩代甘草一兩黃連二兩

豉一兩カクテツセ腹已豆一升石七物丸如梧子空腹服三丸

日三

文云赤白利赤多熱方

犀角六分カクテツセ犀角六分カクテツセ地榆六分カクテツセ黃連八分カクテツセ

錄驗方
膈蜜丸治赤白痢方

出巴郡似大豆一名巴林

文云赤白痢赤多熱方

甘草四分灸
切以水二大升煎取八合去滓七个力丸
空腹分三服

千金方治赤白痢黃連湯方

二兩 石榴皮三兩 阿膠斤力八三兩 七味水七升 煮取二升

三二眼

集驗方治果下赤白方

云草一孔者重
二兩為心

傳信方療赤白痢如鵝鴨肝方

苗黄ヒラキ苓
苗カクイクヒ連各八分
右二味以水二升煎取一升

分二服

廣利方治赤白痢ナ白多ク冷痛方

黃連八分 厚朴五分 炙當歸四分 茯苓六分 乾薑

薑三分切以水一大升七合剪取七合者去澤空腹

八兩服
 忌猪肉生啖

又云赤白痢赤多熱方

犀角六分
黃芩六分
地榆六分
黃連八分

甘草四分炙切以水二大升煎取八合去滓空腹服

要方問方療赤白利腹中絞痛元問遠近方

黃連八分五色龍骨十分黃芩六分右為散以清

飲空腹服方寸匕

八兩服 忌猪肉生冷

又云赤白痢赤多熱方

犀角六分 屑 黃芩六分 地榆六分 黃連八分

甘草四分 切以水二大升煎取八合去澤空腹服

醫門方療赤白利腹中絞痛元問遠近方

黃連八分 五色龍骨十分 黃芩六分 石為散以清

飲空腹服方寸匕

霍亂食經赤白利方

鵲雲雀鴨等任意食之 又方通草子食之

龍門方治赤白痢方

煮薤白腹頃服一椀 不過再驗

又方羊鮑櫻烏豆服一大抄 不過二三

又方取蠟尾草花曝干末服方寸匕 驗

治久赤白利方第廿五

病源論云赤白利是冷熱不調 熱乘於血 滲腸

間與腸間津液相雜而下 甚者腸虛不復 故赤白

連滯久不差也

千金方治下久赤白連年不止及霍亂冷實不消溫

脾湯方

大黃四兩 人參二兩 甘草二兩 干薑二兩

附子一枚大者 五味水六升 煮取二升半分三服

又云治積年常下神方

赤松樹皮去上蒼皮一升 為散 通和升服之 日

三不過服一升 永差不差更服之 秘方廿年利

一百日服之

錄驗方治久赤白下利 補黃二錢上方

補黃二錢 上干薑二錢 上二物合以酒一升 煎服

不過四五服 斷良驗

又云治積年常下神方

赤松樹皮去上蒼皮一升為散通粥和升服之日

三不過服一升永差不差更服之秘方卅年利

一百日服之

錄驗方治久赤白下利補黃二錢上方

補黃二錢上干薑二錢上二物合以酒一升蟄脹

不過四五服斷良驗

樣要方卅年痢不止方

黃連五兩厚朴二兩干薑二兩阿膠兩石榴皮

三兩艾葉三兩右以水七升煮取二升分二服

隨時方治赤白痢連年不差腹中如刀攪或血行下

無問赤白穀痢並主之

白伏苓四大兩黃連四大兩黃蘗四大兩零羊角屑

三兩石檮篩蜜和丸如梧子冷消服之五十九漸

至百丸日再

治白滯利方第廿六

病源論云腸虛而冷氣客之搏於腸間津液凝成

滯自故為白滯利也

千金方治白滯利方

倉米三升水六升煮取三升米爛絞取稠汁服亦

范汪方治赤白滯下晝夜數十行方

烏梅割取皮三兩大棗合干黃連三兩九二物合下篩

和蜜丸如梧子晨服十丸不和稍增可至三十丸

晝夜可六七服若瘕不差可增服七八十丸其間欲

食勿与服藥相近无黃連可用干薑三兩代之

小品方治冷微赤白滯下不斷變成赤黑面汁如爛臭腸

腹痛枯瘦不能飲食方

黃連四兩吳茱萸三兩當歸三兩石榴殼二兩

烏梅ホシクハ割取皮三兩大熱令干黃連三兩凡二物合下篩

和蜜丸如梧子凡晨服十丸不和稍增可至三十丸

晝夜可六七服若瘕不差可增服七八十丸其間欲

食勿与服藥相近无黃連可用干薑三兩代之

小品方治冷微赤白滯下不斷變成赤黑血汁如爛臭腸

腹痛枯瘦不能飲食方

黃連カクテモ四兩 吳茱萸カラハシカア三兩 當歸ヤブセリ三兩 石榴セロハカハ穀二兩

凡四物以水三升漬黄連一夕明旦更加三升水煮

取三升分三服

僧深方治赤白滯下久不斷穀道疼痛不可忍方宜

服溫藥敷塩熨之又方炙枳實熨之

瘕五神女家葛氏方治赤白雜滯下方

赤石脂ホシクハ一升 烏梅ホシクハ廿枚 干薑三兩 合粳米一升水七

升煮取米熟去滓一服七合

又方鼠尾草濃煮煎如薄粥服五合至一升日三

赤下用赤花者白下用白花者佳今案救急單驗方干米服方寸匕

治膿血利方第廿七

病源論云夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血

氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之熱蘊結血化

為膿故成膿血利也所以夏月多苦膿血利膿胃

虛也

范注方治膿血利黃連丸方

黃連カクテモ三兩 黃芩ヒシキ三兩 龍骨タノホ木四兩 黃蘗キハタ三兩 升麻トリノアシクモ

三兩凡五物搗下篩蜜和丸如梧子白飲服

卅九日三

又云治下利赤白膿血桃華湯方

赤石脂二兩 干薑二兩 附子一升

凡三物以水五升煮得三升服一升日三一方有粳米

范汪方治膿血利黃連丸方

黃連^{カクテモ}三兩^{ヒシキ}黃芩^{タノホネ}三兩^{キハタ}龍骨^{トリノアシクモ}四兩^{ヒシハ}黃蘗^{ヒシハ}三兩^カ升麻^カ三兩^カ凡五物^カ搗下篩蜜和丸如梧子^カ白飲服

卅九日三

又云治下利赤白膿血桃華湯方

赤石脂^{ヒシキ}二兩^{ヒシキ}干薑^{ヒシキ}二兩^{ヒシキ}附子^{ヒシキ}一兩^{ヒシキ}凡三物以水五升煮得三升服一升日三^{ヒシキ}元附子^{ヒシキ}

廣濟方療白膿痢方

甘草^{ヒシキ}六分^{ヒシキ}厚朴^{ヒシキ}十二分^{ヒシキ}干薑^{ヒシキ}八分^{ヒシキ}枳殼^{ヒシキ}八分^{ヒシキ}伏苓^{ヒシキ}八分^{ヒシキ}以水五升煮取一升六合分溫三服^{ヒシキ}忌生冷油膩小豆粘食海藻^{ヒシキ}

治水穀利方第廿八

病源論云由體虛^{ヒシキ}湊理用血氣虛^{ヒシキ}春傷於風^{ヒシキ}邪氣^{ヒシキ}留在肌肉之內^{ヒシキ}後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故^{ヒシキ}為水穀利也^{ヒシキ}

葛氏方治水下積久不^{ヒシキ}差腸垢已出者方

赤石脂^{ヒシキ}桂干薑^{ヒシキ}附子^{ヒシキ}各等^{ヒシキ}傷寒^{ヒシキ}蜜丸如小豆服^{ヒシキ}三九日^{ヒシキ}三又方石榴皮^{ヒシキ}一枚^{ヒシキ}黃蘗^{ヒシキ}一兩^{ヒシキ}干薑^{ヒシキ}二兩^{ヒシキ}半以水三升煮取一升二合內^{ヒシキ}膝頓服^{ヒシキ}

醫門方療水穀利腸痛久不^{ヒシキ}差方

厚朴^{ヒシキ}黃連^{ヒシキ}三兩^{ヒシキ}水三升煮取一升空腹服之^{ヒシキ}

救急單驗方治水利方

煮^{ヒシキ}薤白^{ヒシキ}腹頓服一^{ヒシキ}契^{ヒシキ}碗不過再驗^{ヒシキ}

治休息利方第廿九

病源論云冷熱氣調其飲則靜而利^{ヒシキ}息休也^{ヒシキ}腸胃^{ヒシキ}虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其利^{ヒシキ}宜^{ヒシキ}散^{ヒシキ}或上^{ヒシキ}謂之休息利也^{ヒシキ}

僧深方治休息下方

救急單驗方治水利方

煮薤白腹頓服一棗碗不過再驗

治休息利方第廿九

病源論云冷熱氣調其飲則靜而利也休息也
虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其利宜散
或上謂之休息利也

僧深方治休息下方

煮小豆升和臍三兩頓服驗

又云煮薤白腹一椀熱服不過再驗

范汪方治息下休下方酸石榴合皮搗取汁服之

陶景本草注柿大薑者食之又方拳樹皮煮汁服之

葛氏方若久下經時不愈者名息下治之方

龍骨四兩槁如小豆水五升者取二升半冷之

分五服又方黃連如鴨子夫一枚膝如掌大一枚

乾艾一杷水五升煮二物取二升澤內膠洋

分再服但濃煮干艾葉飲之亦佳又方

常煮忍冬飲之

治泄利方第卅

集驗方云黃帝曰人苦泄下利者何對曰春

傷於風夏生濕泄瀉久風為濕泄

論曰泄凡有五種各不同胃泄者飲水不化色黃言

所食飲之物皆完出不消也脾泄者腹脹滿泄注食

即欲注言下利猶如注水不可禁上也大腸泄者食已

窘便白色腹鳴切痛食訖即欲利言痛如刀切其腸也

小腸泄者而便膿血少腹痛也小腸氣在腸故令少

腸痛大瘕泄者裏急後重數至而不能便莖中痛

也瘕者結也小腹有結而復下利者是也

論曰泄凡有五種各不同胃泄者飲水不化色黃言
所食飲之物皆完出不消也脾泄者腹脹滿泄注食
即斂遂言下利猶如注水不可禁上也大腸泄者食已
窘便白色腹鳴切痛食訖即欲利言痛如刀切其腸也
小腸泄者而便膿血少腹痛也小腸氣在腸故令少
腸痛大瘕泄者裏急後重數至而不能便莖中痛
也瘕者結也小腹有結而復下利者是也

范汪方治腹痛消穀心利腹大豆方

取大豆擇先好者服一合所日五服日中四五合
後飯服非飯後可投間服趣盡四五合飲服時
手摩豆令烟光明若苦堅難小減豆

醫門方治泄利或白赤不上腸滑洞泄因極欲死方

酸石榴皮三兩干地黄二兩黃蘗三兩阿膠二兩

水五斗煮取二斗去滓分溫二服

千金方連脾丸主虛勞羸瘦體重胃冷弱不消飲

食宿鳴腹脹泄利不止方

鍾乳二兩赤石脂二兩好麴二兩大麦蘗子二兩當

歸二兩黃連二兩人參二兩細辛二兩龍骨兩

干薑二兩伏苓二兩石斛二兩桂心二兩附子一兩

蜀椒分

凡十五味白蜜丸如梧子酒服十五丸日三稍加至

卅丸弱者飲服此方通治男女凡此方治利之

方神驗者也

小品方云泄利食不消不作肌膚多脾俞泄注便膿血五

色重下多小腸泄利取禁少腹絞痛下三寸今棄千金

方云

治重下方第卅一

葛氏方云重下此謂今赤白痢下也今人下部疾重

卅丸弱者飲服此方通治男女凡此方治利之方神驗者也

小品方云泄利食不消不作肌膚多脾俞泄注便膿血五隨年壯色重下多小腸泄利不禁少腹絞痛多丹田而百壯在香下三寸今案千金

治重下方第卅一

葛氏方云重下此謂今赤白痢下也今人下部疼重故名重下去膿血如鷄子白日夜數十行繞香治之方

熬豉令小焦搗服一升日再三

又方烏梅十枚打破以水二升煮取一升頓服

又方赤石脂一升烏梅十枚干薑三兩粳米

一升水七升煮取米熟去滓一服七合

龍門方治重下方取鼠尾草花曝干末服三方寸

又方末黃連和水服之

令李方治下利重下方

干薑二兩蜀椒二兩桂心二兩凡三物治下後以漿

許後下部中內半品治之

范汪方治重下方蒸滿一席口以水三升煮取一升頓

服不過再神良

錄驗方治下腹中絞痛重下赤白當歸散方

當歸二兩黃連二兩黃蘗二兩干薑一兩

凡四物合下後以烏梅汁服方寸匕日三若腹

中絞痛加當歸下赤加黃蘗重下增黃連白

下增干薑

治病利方第卅二

病源論云甘是人嗜甘味而動腸胃間諸蟲致

令侵食府藏此猶是蟲也從腸裏上食唯咽蟲

斷蠱生瘡下至穀道傷爛下利膿血

凡四物合下後以烏梅汁服方寸匕日三若腹中絞痛加當歸下赤加黃蘗重下增黃連白

下增干薑

治痢利方第卅二

病源論云甘是人嗜甘味多而動腸胃間諸虫致令侵食府藏此猶是蟲也從腸裏上食唯咽蟲斷蟲生瘡下至穀道傷爛下利膿血

要急方治赤白痢利方

頭髮灰如雞子大水服立驗

龍門方治痢積并出無禁心者

進兩拳握細切豉一升酒三升煮取一升頓服不

過三劑差

治盡注利方第卅三

病源論云歲時寒暑不調則有溫毒之氣傷人隨漸至於藏府大腸虛者毒氣乘之毒氣挾氣與血相搏則成血利毒氣侵食於藏府如盡注之狀利血雜膿痰里有片如鷄肝與血雜下是也

小品方治時歲盡注毒下諸湯藥不能治欲死者

方干薑二兩附子二兩黃連二兩禁石二兩九四

物為散酒服方寸匕日三可以飲服

又方黃連一分麴二分治未瘳丸水服如梧子

葛氏方若時歲盡注毒下者方

黃連黃蘗各等鴉藍汁丸如梧子服六七丸至

十四日又方林米一升燒成灰水三升和飲之

治不休水土利方第卅四

病源論云夫四方之氣溫涼而同隨方嗜飲因成性若移其舊習去不習休必因飲食以入腸胃不習便為下利故名不伏水利也即以水穀利是也

葛氏方若眼赤腫注毒下者方

黃連黃蘗各等分キタ梔子ワレ藍汁アヒ丸如梧子服六七丸至

十四日九二又方二枳米ハチ一升モ燒成炭水三升モ和飲之モ

治不伏水土利方第廿四

病源論云夫四方之氣溫涼而同隨方嗜欲因成性

若移其舊習シク不習伏必因飲食以入腸胃不

習便為下利故名不伏水土利也即以水穀利是也

僧深方治諸下利胡虜之人不習食穀下者方用

白頭公二兩オキナモ黃連四兩オキナモ秦皮二兩オキナモ黃蘗二兩オキナモ凡四

物以水八升煮取二升半分三服

本草拾遺云舊著鞋履下フルハ去主人適他方不伏水

去利取赤和水服之不伏水土諸病有異者是也

治臨運吐利方第廿五

病源論云臨運吐利者腸胃虛耶氣并之藏府

之氣自相尅也ル

新錄方ル瀉利兼吐逆及臨者ル

葱白豉キナ各二升ニ永五升煮服一升六合分三服

又方干薑末方寸匕飲日二

僧深方治胃脇有熱胃中支滿臨吐下利方ル

黃芩二兩ヒンキ人參一兩カフ甘草一兩ニ桂心一兩ハヒ凡四物

水八升煮取四升分四服日夜一

治利兼渴方第廿六

病源論云夫水穀之精化為血氣津液以養藏

府虛受風邪入於腸胃故利則津液空竭府

藏虛燥故利而兼渴也ル

僧深方治少陽泄利不絕口渴不可食虛而兼煩云

方附子一枚干薑半兩甘草二升キナ葱白十四枚ニ凡四

物以水三升煮取一升二服先渴後飲者心有停

水一方加犀角一兩ハ

病源論云夫水穀之精化爲血氣津液以養藏
府。虛受風邪入於腸胃故利。則津液空竭府
藏虛燥故利而無渴也。

僧深方治少陽泄利不絕口渴不可食虛而無煩云
方附子一枚干薑半兩甘草二分葱白十四枚凡四
物以水三升煮取一升二服先渴後飲者心有停

水一方加犀角一兩
又方厚朴炙搗末酒服方寸匕日五六

治利無腫方第卅七

病源論云利無腫者是利久脾虛水氣在於肌肉
之間所爲也

雜錄方治利無腫者

素根白皮切一升水四升煮取一升去滓內糖三
和洋分三服又方大麻子三升水一斗研取白汁者
赤小豆爛散豆飲汁良

治利後虛煩方第卅八

病源論云利後虛煩者由府藏尚虛而氣內搏之
所爲也

小品方大烏梅湯治被下之以後虛煩燥不得眠
刺者山巔倒心中懊懣方

大梅十四枚擘好豉七合凡二物以水四升煮梅
令得二升半內頭令四五沸得一升半分二服

千金方治下後煩氣暴上香薷湯方
香薷兩五生藕一把各用子三兩凡二物水五

升煮取二升頓服

僧深方治大下後虛煩不得眠刺者巔倒懊懣

欬死方支子十四枚擘好豆豉七合凡二物水四升先
煮支子令餘二升半汁乃內豉二三沸去滓

令得二升半内頭令四五沸得一升半分二服

千金方治下後煩氣暴上香薷湯方

香薷兩五生藕一把各用子三兩凡二物水五

升者取二升頓服

僧深方治大下後虛煩不得眠刻者顛倒懊懣

歎死方支子十四枚擘好豆豉七合凡二物水四升先

煮支子令餘二升半汁乃内豉二三沸去滓

服一升一服女者勿復服若上氣欬逆加橘皮

二兩忌可加生薑

治利後不能食方第卅九

病源論云利後不能食者由脾胃虛弱氣逆胃

間之所為也

千金方治大下後腹中空竭胃中虛滿不得下食方

夕藥一兩甘草一兩當歸二兩生薑五兩桂枝

厚朴二兩半復二兩凡七物水八升

病源論云下斷之後脾胃虛氣逆過冷析之其

氣未通則令噦

范汪方治大下之後下止臨噦胃中滿塞水漿

不下方

橘皮一兩人參一兩香薷一升一方一兩桂心二

兩生薑五兩半夏三兩甘草一兩凡七物切以

水九升煮取七升去滓内諸藥燄火上煮

取二升半分三服

治利後逆滿方第卅一

病源論云利後而心下逆滿者猶藏虛心下有停

飲氣逆乘之所為也

范汪方治中寒下以後心下逆滿上衝胃中熱

欲頭眩方

水九升煮取七升去滓內諸藥燉火煮
取二升半分三服

治利後遂滿方第卅一

病源論云利後而心下遂滿者猶藏虛心下有停
飲氣遂乘之所為也

范汪方治中寒下以後心下遂滿上衝胃中起
欲頭眩方

伏苓四兩桂三兩白朮二兩甘草二兩凡四物以
水六升煮取三升分三服

治利後穀道痛方第卅二

病源論云神久腸虛耶容於肛門耶氣與真氣
相搏故令疼痛也

新錄方利穀道疼痛方

炒塩慰下部
又方燒蘇去皮內下部良

范汪方利穀道痛方

炙枳實慰之

集驗方治赤白帶下久不斂穀道疼痛不
可忍宜服温藥熬塩慰之

醫心方卷第十一